

Patientenkät vid bakteriell meningit

Det finns ett starkt tryck från bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, som finansierar kvalitetsregistret), att det ska ingå patientrapporterade variabler i registret. Vi har, fr.o.m. januari 2013 inlett en studie där patienter, som vårdats för bakteriell meningit, i samband med utskrivningen ska få en enkät att fylla i. Enkäten, EQ-5D-5L, består av fem frågor med fem svarsnivåer och en totalskattning av livskvalitet och är inte specifik för meningitpatienter. Sex månader efter utskrivningen skickar sedan registret samma enkät till patienterna att ånyo besvara.

Totalt hade det i juni 2018 rapporterats 584?? episoder med bakteriell meningit vårdade under 2013-01-01 till 2017-12-31.

På de följande sidorna presenteras frågorna i enkäten och hur de besvarats av de 113 patienter som svarat på båda enkäterna. Det är således bara 19,3 %?? av patienterna som besvarat enkäten. I vad mån det beror på patienterna eller klinikerna kan vi inte avgöra. Vid våra klinikbesök framkommer dock tydligt att de flesta medarbetare inte känner till enkäten, trots flera utskick. Sannolikt beror därför den låga svarsfrekvensen huvudsakligen på att patienterna inte fått enkäten.

Nedan presenteras frågorna i enkäten och hur de besvarats av de 113 patienter som svarat på båda enkäterna. Medelåldern är 61 år.

Vi har kompletterat diagrammet med normalpopulationen från en undersökning i Stockholm 2006. Deltagarna i den undersökningen var 10 225 personer, 55-73 år gamla. I undersökningen användes EQ5D3L, (fem frågor med tre nivåer, inga/måttliga/svåra problem). Ref: Sun S, Irestig R, Burstrom B, Beijer U, Burstrom K. Health-related quality of life (EQ-5D) among homeless persons compared to a general population sample in Stockholm County, 2006. *Scandinavian Journal of Public Health* 2012;40:115-225


Tre svarsnivåer gör att det inte går att rakt av jämföra svaren i normalpopulationen med resultaten från meningitpatienterna (fem svarsnivåer) men man får i alla fall viss uppfattning om hur det ser ut i en normalpopulation. I diagrammen nedan redovisas andelen meningitpatienter som angett lite till extrema svårigheter medan i normalpopulationen anges måttliga till stora svårigheter. De kan således inte jämföras rakt av, sannolikt till nackdel för meningitpatienterna. Den sista frågan, om livskvalitet, borde dock vara direkt jämförbar.

2018-07-07

MARIA SJÖBERG, PER ARNEBORN

Rörlighet


Normalbefolkningen Måttliga/Svåra problem med att gå omkring 17,4%



Vid utskrivningen hade 65 % av patienterna lite till extrema svårigheter att röra sig och gå omkring, efter 6 månader hade det halverats. I normalbefolkningen var det 17,4 % av de tillfrågade som hade måttliga/svåra problem att röra sig och gå omkring.

Personlig vård

Normalbefolkningen Måttliga /Svåra problem 2,8%




Vid utskrivningen har knappt 40 % av patienterna lite till extrema problem med att tvätta sig och klä sig och efter 6 månader har det sjunkit till 17 %. Bara 2 % har stora/extrema svårigheter efter 6 mån.

I normalbefolkningen var det 2,8 % som har måttliga/svåra problem.

Vanliga aktiviteter

Normalbefolkningen, Måttliga/ Svåra problem, 12,9%.




Vid utskrivningen har 83 % av patienterna lite till extrema svårigheter att utföra vanliga aktiviteter, hushållssysslor m.m. Efter 6 månader har det nästan halverats.

För normalbefolkningen är det 12,9 % som har måttliga/svåra problem med vanliga aktiviteter

Smärtor/besvär

Normalbefolkningen Måttliga/Svåra problem 55%.




Vid utskrivningen har drygt 66 % av patienterna lite till extrema smärtor/besvär, efter 6 månader har fortfarande 53 %.

I normalbefolkningen är det 55 % av de tillfrågade som har måttliga/svåra smärtor/besvär.

Oro/nedstämdhet

Normalbefolkningen Måttliga/ Svåra problem 27,9%.




Vid utskrivningen är nästan 60 % lite till extremt oroliga/nedstämda, efter 6 månader har det sjunkit till 45 %.
I normalbefolkningen är det 27,9 % av de tillfrågade som har måttlig till svår oro/nedstämdhet.

Livskvalitet

Skattad på en skala 0-100%

Normalbefolkningen 77,2 %



Vid skattning av livskvalitet där 0 var sämst och 100 bäst visade resultatet en klar förbättring efter 6 månader från 58 % vid utskrivning och 76 % efter 6 månader. I normalpopulationen var motsvarande siffra 77,2 %.