



Svensk Kataraktkirurgi

Årsrapport 2001 baserad på data från Nationella Kataraktregistret.




Antal kataraktoperationer i Nationella Kataraktregistret samt nationell täckningsgrad under 10 års registrering 1992-2001.

Mats Lundström, Ulf Stenevi, William Thorburn



SVERIGES ÖGONLÄKARFÖRENING
Swedish Ophthalmological Society



Nationella Kataraktregistret
Ögonkliniken, Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona
Fax:0455 20133
www.cataractreg.com

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Bakgrund	4
1. Basregistret	4
Registrets giltighet	4
Resultat	5
Variationer mellan kliniker	9
Variationer mellan landsting	13
Jämförelse mellan åren 1992-01	15
2. Utfallsregistret	20
Deltagare	20
Registerdata	20
Material	21
Resultat	22
Variationer mellan kliniker	22
Jämförelse med tidigare registrering	26
3. Nyttoregistret	28
Deltagare	28
Registerdata	29
Resultat	29
Jämförelse med tidigare år	34
Utvärdering av nyttoregistreringen	35
4. Endoftalmitregistret	36
Diskussion	37
Referenser	39
Bilaga: Protokoll för Nationella Kataraktregistret (utan egna bilagor).	42

Sammanfattning.

Det Nationella kataraktregistret började sin verksamhet den 1 januari 1992. Registret har sin fysiska placering på Ögonkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona. Under de tio verksamhetsåren har cirka 50 operationskliniker årligen rapporterat in till registret sammanlagt 93,7% av alla kataraktoperationer utförda i Sverige.

Registret består av ett basregister som registrerar demografi, väntetider och synskärpa vid tiden för operation. Sedan 1994 har tillkommit ett utfallsregister som registrerar operationsutfall vad gäller synskärpa, avvikelse från planerad refraktion och inducerad astigmatism. Sedan 1995 sker en registrering av patientnytta och därigenom indirekt indikationer för operation. Från och med 1998 registreras även varje fall av endoftalmit (=infektion inuti ögongloben) som uppkommit i anslutning till en kataraktoperation.

Operationsvolymen har ökat under åren 1992-2001, synen preoperativt har blivit bättre och bättre medan ålders- och könsfördelningen varit i stort sett oförändrad.

Registreringen har visat att väntetiden till operation var bäst under de tre första åren. Därefter försämrades situationen och var som sämst under 2000. Skillnaden i väntetider mellan olika kliniker har varit lika stor under hela registreringsperioden (1992-2001).

Operationsfrekvensen varierar mycket mellan landstingen liksom vilken synskärpa man genomsnittligt har vid tiden för operation. Även denna variation har varit i det närmaste lika stor under hela registreringsperioden.

Utfallsregistreringen har visat på goda resultat av kirurgin. De mätpunkter som använts förefaller lämpade för nationell registrering och adekvata för att kunna spegla vissa kvalitetsaspekter på kirurgin.

Nyttoregistreringen har inneburit utveckling av en ny teknik. Analys av data har gjorts i nu avslutade projekt och ytterligare projekt pågår. Nyttoregistreringen tillför ny kunskap vad gäller indikationer för operation.

Endoftalmitregistreringen påbörjades 1998 och utvärdering pågår. Antalet registrerade fall var 1998 cirka 1 promille, 1999 0,5 promille, 2000 0,6 promille och 2001 0,58 promille vilket tyder på en frekvens som är i nivå med den internationellt rapporterade.

Samtliga fyra typer av registrering pågår även under 2002. Samtliga landstingskommunala enheter utom Västerås (Västmanland) rapporterar till registret. Flertalet privata enheter deltar.

Svensk Kataraktkirurgi.

Årsrapport 2001 baserad på data från Nationella Kataraktregistret.

Mats Lundström, Ulf Stenevi, William Thorburn.

(Korrespondens: doc. M. Lundström, Ögonkliniken, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona)

Bakgrund.

Det nationella kataraktregistret startade den 1 januari 1992. De första verksamhetsåren finns beskrivna i tidigare rapporter (1-9). Föreliggande rapport beskriver resultatet av verksamhetsåret 2001, men rapporten innehåller även jämförelser mellan åren 1992 -2001. Kataraktregistret tillkom i första hand för att följa effekterna av den tidigare vårdgarantin. I registret ingick väntetider, prioritetsgrupper, data av demografisk natur vad gäller gråstarrsoperationer samt viss resultatredovisning. Även efter det att vårdgarantin upphört (1/1 1997) har mätning av väntetider förblivit en viktig del av registret. Registreringen har under de tio verksamhetsåren utökats till att omfatta preoperativa data (basregister), registrering av vissa operationsresultat (utfallsregister), registrering av patientens självskattade nytta av operationen (nyttoregister) samt förekomst av komplikation i form av inre ögoninfektion (endofthalmit).

Sedan den 1 januari 1992 finns ett centralt kansli upprättat på Blekingesjukhuset i Karlskrona, dit alla data rapporteras. Inrapporteringen sker antingen via blankett som sänds till kansliet och där matas in i dator eller genom diskett eller via mail varvid data i samlad form direkt överförs till databasen. Det regelverk som styr registrets verksamhet finns beskrivet i ett protokoll som bifogas denna rapport (bilaga 1).

1. Basregister.

Av protokollet (bilaga 1) framgår både aktuella inrapporteringsrutiner med tillhörande blankett och hur data återförs till registrets deltagare med en standardrapport. Registreringen har under 2001 avsett sjukhus, operationslöpnummer, ålder, kön, synskärpa på båda ögon, väntetid, huruvida man tidigare opererats för grå starr (=katarakt) , om det föreligger någon annan ögonsjukdom i operationsögat och i så fall om det är senil makuladegeneration, glaukom, diabetesretinopati eller annan, operationsteknik (= typ av operation) samt typ av inopererad lins.

Registrets giltighet.

Bortfall. Under 2001 har 58 opererande enheter rapporterat in till Kataraktregistret. Det rör sig om 41 offentligt drivna verksamheter och 11 privata. För de offentligt drivna verksamheterna gäller att Halland ses som en verksamhet med två opererande enheter och att Umeå och Lycksele ses som två opererande enheter. Verksamheter på bolagiserade sjukhus betraktas som offentliga. För de privata verksamheterna gäller att det utöver 11 enskilda verksamheter också bedrivits kirurgi av Medocular på 6 orter. Sammanlagt således 17 opererande enheter i privat regi. Totalt har 69.954 operationer inrapporterats till registret. Landets samtliga opererande enheter har redovisat sin operationsvolym under 2001 till Sveriges Ögonläkarförening. Genom jämförelse mellan dessa uppgifter och vad som finns inrapporterat i kataraktregistret kan man bedöma hur stor andel av

kataraktoperationerna från respektive klinik som finns i registret. Inrapporteringsfrekvensen mätt på detta sätt framgår av tabell 1.

Tabell 1. Andel registrerade kataraktoperationer av totalt utförda.

Inrapporterad andel	Antal kliniker	Därav: Offentliga	Privata
≥97%	46	35	11
90-96%	8	5	3
75-89%	4	2	2

Av tillgänglig statistik (Sveriges Ögonläkarförening) framgår att det utfördes 73.513 kataraktoperationer under 2001 fördelat på 19.014 i privat regi och 54.499 i offentlig regi. I kataraktregistret finns 69.954 operationer registrerade (95,2% av totala antalet) fördelade på 18.245 (95,6%) i privat regi och 51.707 (94,9%) i offentlig regi. Sammanfattningsvis kan man konstatera att anslutningen till registret varit mycket god under 2001. En offentligt driven klinik (Västerås) har ej deltagit i registret. Rapporteringsfrekvensen bland deltagande kliniker har varit hög (98,6%). Fyra klinikers enskilda data är möjligen inte representativa på grund av för låg rapportering (Medocular Malmö, Novius, Sundsvall och Falun) men för riket som helhet kan man betrakta registret som ett totalregister för den kataraktkirurgi som utfördes i Sverige under 2001.

Bortfall av data kring enskild operation. Enstaka typer av data har kunnat saknas vid inrapporteringen, men för de flesta data har gällt att registret ej accepterat operationen för inmatning om data saknats. Följaktligen har blanketter kompletterats då data saknats före inmatningen. För samtliga variabler gäller att data saknas i mindre än 1% av operationerna.

Registrets validitet. Test på validiteten av blankettuppgifter gjordes under 1998 på 552 operationer. Avvikelse förelåg i 4,6% av samtliga registrerade variabler. En del av avvikelserna betingades t.ex. av att en sjuklig förändring beskrevs i journalens löptext men återfanns ej i listan av diagnoser vid journalanteckningens slut. En del variabler var fångade vid fel tidpunkt. Storleken på dessa avvikelser var ringa. Slutsatsen av undersökningen var att Kataraktregistrets data är höggradigt pålitliga. Inmatningsprogrammet är så konstruerat att bara rimliga värden på t.ex. synskärpa (0,1-1,0) accepteras. Vid frågor av flervalstyp accepteras bara ett svar. Merparten av inmatningen är gjord av en enda person. Test på inmatningsfel 1992 gav en felprocent på 0,4 och en ny test 1998 visade en felprocent på 0,2.

Resultat.


Data på totalt 69.954 operationer har registrerats under 2001.

Antalet operationer per kalendermånad som inrapporterats framgår av figur 1.

Kön. Operationer på kvinnor uppgick till 46.229 (66,1%) och på män 23.725 (33,9%).


Ålder. Den genomsnittliga åldern för samtliga var 76,1 år. Medelåldern för kvinnor var 76,8 år och för män 74,8 år. Andelen som var 70 år och äldre utgjorde 80,2%.

Åldersklasser för vardera kön framgår av figur 2.



Figur 1. Antal kataraktoperationer månadsvis under 2001.

Tidigare kataraktoperation. Sammanlagt 26.631 operationer (38,1%) utfördes på personer som tidigare blivit katarakterade på det andra ögat. Andelen varierar mycket mellan olika kliniker, från 13,2% till 59,0%.



Figur 2. Antal kataraktoperationer 2001 fördelade på åldersklasser och kön.


Väntetider. Väntetiderna under 2001 framgår av tabell 2 och 3 nedan.

Tabell 2. Antal operationer utförda efter olika lång väntetid (månader).

Väntetid	<1	1-2	2-3	3-4	4-6	6-9	9-12	12-18	>18
Antal operationer:	9662	8302	7825	6872	11353	11093	6325	6146	2376

Tabell 3. Ackumulerad frekvens av operationer som utförts inom viss tid (månader).

Väntetid	1	2	3	4	6	9	12	18
Andel (%)	13,8	25,7	36,9	46,7	62,9	78,8	87,8	96,6



Figur 3. Andel patienter i procent som opererats inom 3 respektive 6 månader under 2001 månad för månad.

Genomsnittligt under 2001 opererades 36,9% av patienterna inom 3 månaders väntetid och 62,9% inom 6 månader. En viss förändring ägde rum under året som framgår av figur 3. Den minskade operationsverksamheten under sommarperioden resulterade i ökade väntetider. Under hösten förbättrades väntetiderna markant vilket bland annat avspeglar den kraftiga volymsökningen under hösten (se figur 1). Den genomsnittliga väntetiden under 2001 var 6,3 månader. Variationen mellan kliniker var 1,1 till 13,7 månader!


Preoperativ synskärpa.

Mediansynskärpan bland samtliga patienter på operationsögat under 2001 var 0,3 och på icke-operationsögat 0,6. Andelen med synskärpa 0,1 eller sämre på operationsögat utgjorde 28,2%. Andelen med synskärpa 0,8 eller bättre på icke-operationsögat var 33,8%. Andelen patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat var 29,7%.

Operationstyp.


Operationstyp ändrades ganska lite under året. Andelen operationer med s.k. fakoteknik utan kombination med andra ingrepp var 97,9%. Andelen operationer med

samtidigt filtrerande (=trycksänkande) ingrepp var 0,5%. Genomsnittligt under året utgjorde extrakapsulära kataraktextraktioner (=ECCE) 0,6% av samtliga operationer. Andelen operationer med främrekammarlins var 0,4% (= 253 st). Sedan registreringen av operationstyp började (1997) har dock stora förändringar ägt rum. Figur 4 visar utvecklingen 1997-2001 (observera skalan på y-axeln).



Figur 4. Fördelningen av operationstyp under 1997-2001. Förkortningar i figurtexten: Fako = fakoemulsifikation, ECCE = extrakapsulär kataraktextraktion, Trab = trabekulektomi, Bkl = bakrekammarlins, Fkl = främrekammarlins.

Linsmaterial.



Figur 5. Typ av linsmaterial under 1997-2001. Andelen av varje typ anges i procent av det totala antalet linsor för varje år.


Under 2001 registrerades för femte året vilket material den inplanterade linsen var gjord av. Under året var förändringarna små. Andelen inplanterade linser gjorda av s.k. akrylmaterial var 85,6%, silikon 9,5% och hydrogel 0,9%. Linser av PMMA utgjorde 1,1% och Heparinbehandlad PMMA likaså 1,1%. Andelen operationer då ingen lins inplanterades var 0,5% (325 operationer).

Figur 5 visar utvecklingen under perioden 1997-2001 för de vanligaste linserna.

Variationer mellan kliniker.

Tillgänglighet.

Ett av registrets ursprungliga syften var att följa hur klinikerna klarade vårdgarantin. Att följa tillgängligheten i form av väntetider till operation är fortfarande ett av registrets huvudsyften. I nedanstående figur visas spridningen mellan olika kliniker när det gäller hur stor andel av patienterna som opererats inom 3 respektive 6 månader.



Figur 6. Andel i procent av patienter som blivit opererade inom 3 respektive 6 månader under 2001. Varje stapel utgör en klinik. Klinikerna sorterade efter hur stor andel patienter som opererats inom 3 månader (nedre del av stapel). Stapelns hela längd motsvarar hur stor andel patienter i procent som blivit opererade inom 6 månader.


Av figur 6 framgår att spridningen i tillgänglighet i form av väntetider var mycket stor under 2001. Sämst tillgänglighet innebar att 3,5% av de väntande blev opererade inom 3 månader och att den genomsnittliga väntetiden var 13,7 månader. Bäst tillgänglighet innebar att 100% av patienterna blev opererade inom 3 månader och att den genomsnittliga väntetiden var under 1 månad.

Indikationer.

Registerdata medger jämförelse mellan klinikerna när det gäller vissa variabler som är associerade till vilka indikationer för operation som tillämpas.


En sådan variabel är synskärpan på bästa ögat. En synskärpenivå som ofta används vid jämförelser är synskärpa 0,5 på bästa ögat, då ju denna nivå bland annat uttrycker gränsen för tillåtelse att kör bil (förutsatt att inga andra defekter föreligger i

synsystemet). Andelen med synskärpa under 0,5 på bästa ögat före operation är en kvalitetsindikator enligt Socialstyrelsens förslag* och bör understiga 20%. Under 2001 var andelen 29,7% för samtliga registrerade operationer. I nedanstående figur visas spridningen mellan klinikerna när det gäller hur stor andel i procent av de opererade patienterna som hade en synskärpa på bästa ögat på mindre än 0,5 före operationen.



Figur 7. Andel (%) patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat. Varje stapel motsvarar en opererande enhet. Genomsnitt för alla: 29,7%.

En annan variabel som också är associerad till indikationer för operation är hur många operationer som utförs på patienter som redan fått ett öga opererat för grå starr (= operation på andra ögat).



Figur 8. Andel operationer (%) som utförts under 2001 på patienter som tidigare blivit opererade på ett öga för grå starr. Varje stapel motsvarar en klinik. Nedre delen av

stapeln anger hur stor andel av patienterna som hade synskärpa $\geq 0,8$ på det tidigare opererade ögat. Denna variabel är en kvalitetsindikator enligt Socialstyrelsens förslag* och bör utgöra minst hälften av andelen som opereras på öga 2.


Ovanstående figur visar spridningen mellan kliniker när det gäller andelen operationer på andra ögat. Den lägsta andelen operationer av andra ögat var 13,2% och den högsta andelen 59,0%. Nästan hälften (49,8%) av dem som opererades på sitt andra öga hade en synskärpa på 0,8 eller bättre på det först opererade ögat på riksnivå. Enligt Socialstyrelsens förslag* till kvalitetsindikatorer i ögonsjukvården bör denna variabel uppgå till minst hälften av dem som genomgår en operation av öga 2. Denna grupp utgjorde 19,0% av alla patienter som genomgick en kataraktoperation under 2001. På klinikinivå utgjorde denna grupp mellan 7,4% och 29,7% av samtliga opererade (Figur 8).

För båda variabler associerade till vilka indikationer man har för operation av grå starr gäller att det föreligger en mycket stor spridning mellan klinikerna.

*. Övergripande kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvården (<http://www.sos.se/FULLTEXT/110/2001-110-1/2001-110-1.htm>)

Teknikval.


Övergången från extraktion av linskärnan manuellt genom större snitt (s.k. ECCE teknik) till extraktion av linskärnan med s.k. fakoemulsifikation genom ett mindre snitt är i det närmaste genomförd på samtliga kliniker. Genomsnittligt i Sverige under 2001 användes fako-tekniken i 98,4% av operationerna. Spridningen mellan klinikerna var ganska liten, vilket framgår av figur 9.




Figur 9. Andel (%) av operationerna på respektive klinik som utförts med s.k. fako-teknik. En stapel motsvarar en klinik. Värdet för respektive klinik anger andelen av vanliga fako-operationer med bakre kammarlins + andelen operationer med fako-teknik med bakre kammarlins och samtidigt trycksänkande ingrepp. Observera skalan på y-axeln.

Den nya operationstekniken med fakoemulsifikation innebär att den grumlade linsen kan tas ut genom ett litet snitt. Skall därefter en hård lins inplanteras i ögat måste snittet vidgas. Användes en mjuk vikbar lins i stället, behöver snittet vidgas obetydligt eller inte alls. Det innebär att en vikbar (=mjuk) lins tar till vara fako-teknikens lilla operationssnitt på ett bättre sätt än en stel (=hård) lins.

Det föreligger en mycket liten kvarstående spridning mellan klinikerna när det gäller i vilken utsträckning man tagit upp tekniken med vikbar lins (se figur 10).



Figur 10. Andel (%) vikbara linser av totala antalet linser som använts under 2001. Varje stapel motsvarar en klinik. Vikbara linser betyder i denna figur summan av andelen silikon-, akryl- och hydrogellinser som respektive klinik använt.



Figur 11. Andel kataraktoperationer som resulterat i en lins i främre ögonkammaren (Fkl: blå, övre del av stapel) eller ingen lins inplanterad (röd, nedre del av stapel). Varje stapel är en klinik och andelen operationer anges i procent.

Vid en primär kataraktoperation är det idag alltid kirurgens avsikt att placera en lins i bakre ögonkammaren. Placeras linsen i främre eller avstår man från att inplantera en lins innebär det därmed nästan alltid att en komplikation inträffat under operationen. Andelen operationer med en lins i främre kammaren var under 2001 0,36% i genomsnitt i landet och andelen där ingen lins inplanterades var 0,47%. Spridningen mellan olika kliniker visas i figur 11.


Variationer mellan landsting.

Enskilda landstings verksamhet kan inte beskrivas med full säkerhet då det förekommer fria vårdval och därmed sjukvårdskonsumtion över landstingsgränser. Mätningar i kataraktregistret under 1992 och 1993 visade att det under denna period dock var små rörelser (<3%) över landstingsgränserna med undantag för områden runt de stora befolkningscentra i södra och västra Sverige. Detta har sannolikt ökat något under senare år. I denna rapport redovisas varje landstingsområde för sig med några undantag. All sjukvård i Skåne är sammanslaget till Skåne län. Västra Götaland är redovisat som ett område.

Rapporteringsfrekvens. För alla landstingsområden utom Västmanland gäller att mellan 90 och 100% av alla kataraktoperationer finns i registret. Från Västmanland finns inget rapporterat då Västerås Ögonklinik ej deltar i registreringen.


Patientdata. Väntetider är inte meningsfullt att aggregera på landstingsnivå. Vissa landsting har inom sina gränser kliniker med både mycket korta och mycket långa väntetider. Slås klinikernas siffror samman får man intetsägande medelvärden som ger ett genomsnittligt intryck.

Operationsfrekvens. Dessa värden är baserade såväl på registrets data som på de volymer som rapporterats in till Ögonläkarföreningen och på befolkningsregistret. Av sammanställda data framgår att i 3 av 20 landstings-områden opererades mer än 9 promille av befolkningen under 2001 med ett högsta värde på 9,61 operationer per 1000 invånare. Två av 20 ligger under 6 promille med ett lägsta värde på 5,17 promille (se figur 12).




Figur 12. Operationsfrekvens (operationer per 1000 invånare) per landstingsområde. Varje stapel motsvarar ett landstingsområde. Västmanland saknas.

Antal operationer per 1000 invånare har en inbyggd felkälla då merparten av operationerna utförs på den del av befolkningen som är 70 år och äldre och då landstingsområden skiljer sig åt vad gäller befolkningens åldersfördelning. I nedanstående figur visas också antal operationer i procent på befolkningen som är 70 år och äldre.



Figur 13. Antal operationer per 1000 invånare och landstingsområde (staplar, vänster skala) samt antal operationer per 100 invånare som är 70 år och äldre (linje, höger skala). Av figuren framgår att Stockholms Läns Landsting och Upplands Läns Landsting som har en förhållandevis stor yngre befolkning har relativt sett högre operationsfrekvens mätt på den äldre delen av befolkningen.




Figur 14. Andel patienter i procent (y-axeln) med syn <0,5 på bästa ögat före

operation. Varje stapel = ett landstingsområde. Diagrammet visar spridningen 2001.

När det gäller synskärpevärden förekommer stora variationer mellan kliniker inom samma landstingsområde, men då denna uppgift är väsentlig för att kunna bedöma vid vilken funktionsnivå man genomsnittligt opererar har vi valt att göra en sammanställning avseende synskärpenivå (figur 14). Sammanställningen visar att i genomsnitt mellan 21,4% och 48,1% av de opererade patienterna såg under 0,5 på bästa ögat före operation beroende på i vilket landsting man opereras.


Som framgår av ovanstående existerar det stora olikheter i landet mellan landstingsområden både vad gäller operationsfrekvens och vid vilken synskärpenivå man opererar genomsnittligt. Naturligtvis finns det ett samband mellan dessa variabler och figur 15 nedan visar förhållandet mellan operationsfrekvens och synskärpa före operationen.



Figur 15. Förhållandet mellan operationsfrekvens (operationer per 1000 inv.) (x-axeln) och andel patienter (%) med synskärpa < 0,5 på bästa ögat för operation (y-axeln). Varje prick motsvarar ett landstingsområde.

Jämförelse mellan åren 1992-2001.

Anslutning. Anslutningen till registret blev hög redan första året. Det totala antalet kataraktoperationer i Sverige och andelen som registrerats i kataraktregistret framgår av figur 16. Från början ingick enbart operationer utförda på landstingskommunala enheter, sedan 1993 ingår också en del operationer utförda på privata kliniker. Andelen rapporterade operationer från offentlig respektive privat vård framgår av nedanstående tabell.



Figur 16. Totala antalet kataraktoperationer i Sverige åren 1992-2001 (staplar) samt andelen som ingår i det nationella kataraktregistret (nedre del av stapel).

Tabell 4. Andel rapporterade operationer i procent från offentlig respektive privat vård åren 1992-2001.

År	Rapporteringsfrekvens offentlig vård	Rapporteringsfrekvens privat vård
1992	89	0
1993	97,5	33,0
1994	96,5	72,6
1995	94,9	73,4
1996	96,9	78,3
1997	97,6	81,3
1998	98,8	79,2
1999	98,1	79,0
2000	95,2	89,6
2001	94,9	95,5

Hur stor del av de egna operationerna som varje klinik rapporterat till registret är av intresse. En hög andel rapporterade operationer är ett villkor för att registret skall kunna anses som ett totalregister utan risk för att utgöra ett medvetet urval. I nedanstående tabell visas hur stor andel av sina respektive operationer som klinikerna rapporterat åren 1992-2001.


Tabell 5. Rapporteringsfrekvens bland deltagande kliniker i kataraktregistret.

År	Antal kliniker som rapporterat				Totalt antal kliniker
	≥97%	90-96%	75-89%	<75% av sina operationer	
1992	27(68%)	7	5	1	40
1993	35(74%)	7	1	4	47
1994	40(78%)	6	2	3	51
1995	34(68%)	9	3	4	50
1996	41(87%)	3	2	1	47
1997	38(78%)	8	1	2	49
1998	41(84%)	6	2	0	49
1999	40(83%)	4	1	3	48
2000	40(77%)	9	1	2	52
2001	46(79%)	8	4	0	58

Av tabellen framgår att andelen kliniker med mycket hög rapporteringsfrekvens varierat under perioden. Det växlande antalet kliniker totalt under åren beror på att nya kliniker etablerats och att en del kliniker slagits samman till en enhet.

Köns- och åldersfördelning. Fördelningen mellan kvinnor och män har ändrats obetydligt under 10-årsperioden. Andelen kvinnor har varierat åren 1992 – 2001 mellan 65,9% och 66,4% utan någon tendens.


Även åldersfördelningen har varit ganska konstant. I nedanstående figur visas fördelningen mellan olika åldersklasser för vart och ett av de tio årens material.



Figur 17. Stapeldiagram visande hur stor andel i procent varje åldersklass utgör under vart och ett av åren 1992-2001.

Av figur 17 framgår att det relativt sett ägt rum en viss minskning av åldersintervallet 65-74 år och en viss ökning av åldersintervallet 55-64 samt 85-99 år. Summaeffekten är att medelåldern ändrats från 75,2 till 76,1 år.


Operation av öga nr 2. Andelen patienter som fått sitt andra öga opererat för katarakt har ökat under perioden från 28,5% till 38,1%. Antalet kataraktoperationer i absoluta tal i registret har ökat med 37.511 ingrepp från 1992 till 2001. Av denna ökning utgjorde operation på första ögat 20.072 och operation på andra ögat 17.439 ingrepp.



Figur 18. Antalet operationer i registret 1992-2001 fördelade på öga 1 och öga 2. Notera att det är utvecklingen av operationer på öga 1 som beskriver hur många individer i samhället som genomgått kataraktoperation på ett eller två ögon.


Väntetider. Utvecklingen av väntetider har varit sådan att under 1993 var andelen patienter som blivit opererade inom 3 månader störst. Nedanstående figur 19 visas hur stor andel patienter som blivit opererad inom 3 respektive 6 månader under perioden.

Som framgår av figur 19 var väntesituationen bäst under 1993 för andel opererade inom 3 månader och under 1994 för andel opererade inom 6 månader. Den sämsta väntesituationen rådde under år 2000.



Figur 19. Andel patienter i procent som blivit opererade inom 3 respektive 6 månaders väntetid.

Synskärpa. Under registreringsperiodens början var mediansynskärpan på bästa ögat 0,5. Sedan 1998 är detta värde 0,6. Mediansynskärpan på operationsögat var 1992 0,1 och de följande åren till och med 1998 0,2. Sedan år 2000 har mediansynskärpan på operationsögat varit 0,3. Ett annat sätt att beskriva synskärpan preoperativt är att se på hur stor andel i procent som ser $\leq 0,1$ på operationsögat eller $\geq 0,8$ på bästa ögat. Nedanstående figur (figur 20) visar detta årsvis under hela registreringsperioden.



Figur 20. Utveckling av synskärpa under åren 1992-2001. Vänster stapel visar andel i % som ser $\leq 0,1$ på operationsögat. Höger stapel visar andel i procent som ser $\geq 0,8$ på bästa ögat.

Synskärpa 0,5 på bästa ögat uttrycker en viktig funktionsnivå. Denna synskärpa utan andra synproblem utgör lägsta gräns för tillstånd att inneha körkort för bil. Andelen patienter som låg under denna nivå vid tiden för operation har minskat för varje registreringsår. Under 1992 var det 44% av patienterna som låg under denna nivå på bästa ögat, under 2001 var andelen 29,7%. Ser man till hela perioden har synskärpan hos de som skall opereras gradvis blivit bättre.

En viktig anledning till denna utveckling har varit det stigande antalet operationer av andra ögat. Av registerdata framgår att under 1992 opererades 3844 (11,8% av samtliga i registret) patienter på sitt andra öga med en synskärpa på minst 0,8 på det tidigare opererade ögat. Under 2001 var denna siffra 13.253 (19,0%).

2. Utfallsregister.

I utfallsregistreringen 2001 deltog 35 kliniker.

Deltagare.

Ögonklinikerna:

S:t Eriks Ögonsjukhus	Uppsala (Akad.)	Eskilstuna
Nyköping	Linköping	Norrköping
Jönköping	Växjö	Västervik
Kalmar	Visby	Karlskrona
Lund	Helsingborg	Landskrona
Halmstad	Möndal	Borås
Hudiksvall	Gävle	Skellefteå
Gällivare	Sunderbyn	Eksjö
Strandvägskliniken	Ystad	Piteå
Europakliniken	Sophiahemmet	Läkargruppen, Örebro
NU-sjukvården	Medocular, Göteborg	Rubes Ögonklinik
Medocular, Malmö	Transmedica	

Registreringen omfattade alla patienter som opererades för katarakt under mars månad. Denna månad skiljer sig inte från övriga vad beträffar typ av patienter. Figur 21 visar frekvensen av fyra variabler som vid kataraktkirurgi är viktiga ur s.k. case-mix synpunkt. Figuren visar frekvensen månad för månad 2001 i basregistret.


Registerdata.

Vissa preoperativa och postoperativa data noterades på en särskild blankett. Blanketten ifylldes på den opererande kliniken och insändes därefter till Kataraktregistret för registrering. Peroperativa data på dessa patienter hämtades från checklistan (basregistret).

Följande *preoperativa* data registrerades utöver de som fanns i basregistret: operationslöpnummer, K-värden i dioptrier med vinklar och planerad refraktion.

Följande *peroperativa* data hämtades från basregistret: om fakoemulsifikationsteknik användes, typ av intraokulär lins (bakrekammarlins, främrekammarlins eller ingen lins) samt typ av operation (kataraktoperation eller kataraktoperation kombinerad med annan operation såsom trabekulektomi eller hornhinnetransplantation).

Följande *postoperativa* data registrerades: datum för slutkontroll, synskärpa på aktuellt operationsöga, refraktion på båda ögon, synskärpa andra ögat, K-värden på aktuellt operationsöga i dioptrier med vinklar, huruvida någon annan synpåverkande ögonsjukdom förelåg i operationsögat, om patienten ej avslutats, om patienten ej kunnat medverka till undersökningen och om patienten avlidit.



Figur 21. Andel kvinnor, andel 70 år och äldre, andel som opererades på andra ögat och andel patienter med annan ögonsjukdom i operationsögat månad för månad i basregistret.

Av ovanstående registrerade data i kombination med basregistrets data värderades följande utvalda kvalitetsindikatorer avseende olika faser i omhändertagandet:

Kvalitetsindikator

Andel inrapporterade av totalt utförda operationer

Kvalitet som avspeglas

Registreringens validitet.

Avvikelse från planerad refraktion

Huvudsakligen förundersökningsteknik.

Andel främrekammarlinser i förhållande till andel bakre kammarlinser

Operationsförlopp.

Inducerad astigmatism

Huvudsakligen operationsteknik.

Färdigbehandlade inom 3 mån.

Operationsförlopp och/eller komplikationer efter operation och/eller servicekvalitet (tillgänglighet).

Färdigbehandlade inom 6 mån.

Operationsförlopp och/eller komplikationer efter operation och/eller servicekvalitet (tillgänglighet).

Postoperativ synskärpa

Preoperativ diagnostik och/eller operationsförlopp och/eller komplikationer.

Material.

Under mars månad 2001 utfördes på de aktuella klinikerna sammanlagt 5.144 operationer. Av dessa registrerades operationsutfall på 4.677 operationer (90,9%). På samma kliniker utfördes 48.412 operationer under hela 2001 vilket innebär att utfallsregistreringen omfattar i genomsnitt 9,7% av de deltagande klinikernas årsproduktion.

Ser man till de enskilda klinikernas rapporteringsfrekvens när det gäller utfallsregistreringen så har 26 kliniker av 35 rapporterat mer än 90% av operationerna som utfördes under mars månad. Detta får anses vara tillräckligt hög rapporterings-frekvens för att materialet skall vara representativt. Sex kliniker har rapporterat mellan 75 och 90% och fyra kliniker under 75% (Kalmar, Lund, Gävle och Sophiahemmet) av sina operationer under mars månad vilket knappast kan anses som representativt.

Medelåldern hos de utfallsregistrerade var 76,6 år och andelen kvinnor var 66,9%.

Resultat.

I hela materialet blev den genomsnittliga skillnaden mellan planerad och slutlig refraktion 0,62 dioptrier. Inom 1 dioptri avvikelse återfanns 81,8% av samtliga patienter.

Den inducerade astigmatismen blev i genomsnitt 0,58 dioptrier. Detta värde är uträknat med hjälp av den s.k. subtraktionsmetoden. Inom 1 dioptri inducerad astigmatism fanns 85,9% av samtliga opererade.


Tas hänsyn till vinkelförändringar vid uträkning av den inducerade astigmatismen som t.ex. då Naesers polära värde beräknas blev den genomsnittliga inducerade astigmatismen 0,74 D.

Färdigbehandlade efter operationen inom 3 månader blev 89,5% av samtliga opererade. När ett halvt år förlöpt efter operationen var fortfarande 2,7% ej färdigbehandlade.

Synskärpan på operationsögat var 0,5 eller bättre hos 83% av de opererade.

Variationer mellan kliniker.

Utfallsregistreringen omfattar 9,7% av de deltagande klinikernas "årsproduktion".



Figur 22. Andel i procent inrapporterade operationer för registrering av utfall av 2001 års totala antal opererade. Varje stapel motsvarar en klinik.

Denna andel varierar naturligtvis från klinik till klinik. Ovanstående figur 22 visar denna variation som ett stapeldiagram där varje stapel representerar en klinik.

Samtliga kvalitetsindikatorer varierar mellan klinikerna (se tabell 6).


Tabell 6*. Variationsbredden i klinikernas medelvärden och medianvärden.

Kvalitetsindikator	Min	Max	Medel	Median
Andel rapporterade i %.....	28,0	100	90,6	95,9
Avvikelse från planerad refraktion i dioptrier (jämför fig. 24)...	0,37	1,96	0,62	0,65
Andel i % som avvikit högst 1D. från planerad refr.....	19,4	96,3	81,8	79,5
Inducerad astigmatism i dioptrier (jämför fig. 22).....	0,26	0,82	0,58	0,54
Andel i % med inducerad astigmatism inom 1D	72	100	85,9	89,3
Uppföljningstid, medelvärde i dagar.....	8	117	48	46
Andel som ej avslutats inom 6 månader i %.....	0	19,4	2,7	3,1
Andel i % med visus $\geq 0,5$ på operationsögat postoperativt.				
Alla patienter.....	78	100	87	88


* OBS. Tabellen visar medelvärden av klinikernas resultat, ej av samtliga ingående patienters resultat.

Tabellen visar att det för alla parametrar finns en stor spridning i resultat mellan de deltagande 35 klinikerna.

Figur 23 visar spridningen klinikvis när det gäller inducerad astigmatism.




Figur 23. Diagram visande inducerad astigmatism. Varje stapelgrupp motsvarar en klinik. Staplarna visar den inducerade astigmatismen i dioptrier mätt med olika metoder. Dessa metoder är från vänster till höger: Subtraktionsmetod, Naesers polära värde och Algebraisk metod. Den första metoden tar inte hänsyn till om astigmatismens vinklar ändras av operation. De två senare metoderna väger in även vinkelförändringar i den totala åstadkomna astigmatismen. Endast 17 kliniker har valt att rapportera in variabeln som ligger till grund för detta diagram (en klinik saknas i redovisningen på grund av för få fall).




Figur 24. Diagram utvisande inducerad astigmatism enligt Naesers polära värde. Varje klinik representeras av en box. Inom boxen finns 50% av värdena och den mörka linjen markerar medianvärdet. De vertikala linjerna innesluter 95% av värdena.

Det förekommer en relativt stor spridning av värden för varje klinik och dessutom ofta en skev fördelning med ett antal ganska höga värden. Detta framgår av figur 24 ovan. Klinikvariationen är ungefär lika stor när det gäller skillnaden mellan planerad och slutlig refraktion vilket framgår av figur 25.



Figur 25. Skillnad mellan avsedd och slutlig refraktion. Varje stapel representerar en kliniks medelvärde. Skillnaden uttryckt i dioptri.


Även när det gäller denna variabel uppvisar klinikerna olika stor spridning av värden. Dessutom finns i vissa fall en uppenbar skev fördelning med några höga värden. Denna spridning och sneda fördelning framgår av box-plot diagrammet i figur 26.



Figur 26. Skillnad mellan avsedd och slutlig refraktion. Varje klinik representeras av en box. Inom boxen finns 50% av värdena och den mörka linjen markerar medianvärdet. De vertikala linjerna innesluter 95% av värdena.

Klinikernas genomsnittliga resultat är starkt beroende av vilken operationsteknik som användes.

Under de senaste två åren har refraktionen på det öga som inte opererats också registrerats. Anledningen är att skillnaden i brytkraft mellan ögonen är viktigt för synkomforten. Skillnaden får inte vara för stor vilket kan leda till att patienten erfar svårigheter att utföra dagliga sysslor. Detta har påvisats i projektarbete vid registret. I figur 27 nedan redovisas skillnaden i brytkraft mellan det opererade ögat och det andra ögat per klinik.



Figur 27. Skillnad i brytkraft mellan det opererade ögat och det icke opererade. Varje box innesluter en kliniks mellersta 50% av värdena. Inom de horisontella linjerna återfinns 95% av värdena. Ingen rangordning av kliniker. Den svarta linjen är medianvärde. Outlayers och extremvärden är borttagna från diagrammet.

Jämförelse med tidigare registrering.

Registrering av utfall har pågått under sju år i registrets regi. Under denna period har 13 kliniker deltagit varje år. Dessa är ögonklinikerna i


Eskilstuna
Växjö
Karlskrona
Möndal
Europakliniken

Norrköping
Västervik
Lund
Borås

Jönköping
Kalmar
Helsingborg
Boden/Sunderbyn

Ett viktigt syfte med det Nationella Kataraktregistret är att stimulera de enskilda klinikerna i deras förbättringsarbete. Hur har då resultaten sett ut för de kliniker som

deltagit varje år i utfallsregistreringen? I figur 28 nedan visas hur den genomsnittliga inducerade astigmatismen (subtraktionsmetod) fördelat sig för klinikerna under varje registreringsår.




Figur 28. Genomsnittlig inducerad astigmatism (mätt i dioptri) hos de kliniker som deltagit i registreringen av inducerad astigmatism under 1995 till 2001. Diagrammet visar således klinikers medelvärden, ej enskilda patienter. Varje box representerar en registreringsperiod. Antalet deltagande kliniker ses under x-axeln.

Varje box innesluter de mellersta 50% av värdena. Inom de horisontella linjerna återfinns 95% av värdena. Den svarta linjen är medianvärde. Outlayers och extremvärden är borttagna från diagrammet.

Som framgår av figur 28 har klinikernas genomsnittliga inducerade astigmatism minskat under perioden. Spridningen mellan kliniker har också minskat. Viss variation mellan klinikerna föreligger. Utvecklingen för en klinik när det gäller denna variabel beror på många faktorer. Den viktigaste faktorn är sannolikt när och i vilken takt man övergått från operationer med s.k. ECCE-teknik till fako-teknik. Använder man huvudsakligen fako-teknik ger sannolikt användandet av vikbar lins och litet snitt mindre astigmatism än om snittet vidgas och en hård lins inplanteras. Till denna teknikförändring hör en inlärningskurva med till en början varierande resultat. Skiftande bemanning när det gäller kirurger från ett år till ett annat spelar naturligtvis också stor roll för resultatet.

Skillnaden mellan planerad och slutlig refraktion är en viktigt utfallsmått som följts under varje registreringsperiod. Detta mått avspeglar både säkerheten i biometrin före operationen då man bestämmer styrkan på den lins som skall inplanteras och tekniken vid operationen. Klinikernas resultat under de sju år som registreringen pågått visas i figur 29 nedan.



Figur 29. Klinikernas genomsnittliga skillnad mellan planerad och slutlig refraktion. Diagrammet visar således klinikers medelvärden, ej enskilda patienter. Varje box representerar en registreringsperiod. Antalet deltagande kliniker ses under x-axeln. Varje box innesluter de mellersta 50% av värdena. Inom de horisontella linjerna återfinns 95% av värdena. Den svarta linjen är medianvärde. Outlayers och extremvärden är borttagna från diagrammet.

Som framgår av figur 29 har en viss förbättring ägt rum. Klinikernas resultat när det gäller den genomsnittliga avvikelser mellan avsedd och slutlig brytkraft i ögat har gradvis blivit bättre. Mättekniken har dock sina begränsningar och metoden tillåter inte att med säkerhet påvisa förändringar under 0,5 Dioptrier.

3. Nyttoregister.

Sedan 1995 ingår även en registrering av patientens nytta av kataraktoperationen. Denna registrering bygger på en självinstruerande patientenkät som ifylles av patienten dels före dels 6 månader efter operationen.

Deltagare.

Följande 26 kliniker deltog i nyttoregistreringen under mars månad 2001.

S:t Eriks, Stockholm	Eskilstuna	Nyköping
Linköping	Norrköping	Jönköping
Växjö	Kalmar	Visby
Karlskrona	Lund	Helsingborg
Halmstad	Möndal	Borås
Hudiksvall	Skellefteå	Strandvägskliniken

Piteå
Läkargruppen, Örebro
Rubes Ögonklinik

Europakliniken
NU-sjukvården
Medocular Malmö

Sophiahemmet
Medocular Göteborg

Registerdata.

Patienterna fick i samband med förundersökning eller på operationsdagen fylla i en enkät som avsåg situationen omedelbart före operationen. Från Kataraktregistret utsändes samma enkät 6 månader efter operationen. I samband med postenkäten betonades bland annat frivilligheten i deltagandet.

Frågorna i enkäten handlar om

- 1/ aktivitetsnivå
- 2/ synbesvär vid några vanliga dagliga aktiviteter
- 3/ en global självskattning av synbesvär och nöjdhet med synen
- 4/ besvär från kataraktsymptom (bländning, sidoskillnad mellan ögonen etc.)
- 5/ förekomst av andra sjukdomar
- 6/ vissa frågor om självständighet (hemhjälp, färdtjänst, yrkesarbete, bilkörning).

Resultat.

En komplett ifylld enkät 1 + 2 föreligger hos sammanlagt 2819 patienter.

Villkoret att ha fyllt i båda enkäter samt ha kompletta registerdata från utfallsregistreringen uppfyllde 2454 patienter.

1. Samtliga patienters åsikter före och efter operationen (N=2819).


Patientenkäterna är avsedda att tolkas parvis för varje patient så att skillnaden mellan det preoperativa och det postoperativa enkätsvaret värderas. Det kan dock vara av ett visst värde att se hur enkätsvaren fördelar sig för stora patientgrupper och i denna rapport redovisas översiktligt tre variabler nämligen patienternas uppfattning om

- besvär att utföra specifika dagliga aktiviteter
- allmänna besvär och nöjdhet med synförmågan
- kataraktsymptom.

Besvär att utföra specifika dagliga aktiviteter.

Frågorna gäller 7 olika dagliga aktiviteter och svarsalternativen är om man upplever "mycket stora besvär", "stora besvär", "vissa besvär" eller "inga besvär" vid aktiviteten i fråga. Det finns också ett svarsalternativ "kan ej ta ställning".


I nedanstående figur visas hur stor genomsnittlig procentandel som tyckte att man upplevde mycket stora eller stora besvär vid att utföra var och en av dessa 7 dagliga aktiviteter före operation och 6 månader efter operation.



Figur 30. Andel patienter i % som angav sig uppleva mycket stora besvär eller stora besvär vid att utföra 7 dagliga aktiviteter före operation (vänster stapel) och 6 månader efter operation (höger stapel).


Synbesvär i allmänhet och nöjdhet med synförmågan.

1. Nedanstående figur visar patienternas uppfattning om sina besvär i allmänhet på grund av synpåverkan.



Figur 31. Patienternas uppfattning om sin allmänna besvärsgrad på grund av synpåverkan före (vänster stapel) och 6 månader efter operation. Staplarna uttrycker andelen i % med en viss åsikt.


2. Nedanstående figur visar hur nöjd eller missnöjd man var med sin synförmåga före och 6 månader efter en operation.



Figur 32. Patienternas uppfattning om man var nöjd eller missnöjd med sin synförmåga före (vänster stapel) och 6 månader efter operation. Staplarna anger andelen i % med en viss åsikt.

Kataraktsymptom.

I enkäten har efterfrågats vilka besvär man upplevt av bländning och sidoskillnad mellan ögonen. I nedanstående figur redovisas patienternas åsikt före och efter operation.



Figur 33. Besvär av bländning och sidoskillnad mellan ögonen före och 6 månader efter operation. Staplarna anger andelen patienter i procent som gav uttryck för den aktuella åsikten.

Förutom upplevda besvär har patienterna fått svara på ett antal frågor som har med förmåga till självständigt leverne att göra. I nedanstående tabell visas dessa resultat.

Tabell 7.
Förmåga att klara sig själv

Färdighet	Före operation	6 månader efter operation
Ingen hemhjälp	80%	80%
Ingen färdtjänst	79%	77%
Arbetar	10%	9%
Av dessa: Ej sjukskriven	83%	86%
 Kör bil både när det är ljust och mörkt	 17,4%	 28,9%

2. Resultat på individnivå (N=2454).

Det egentliga syftet med nyttoregistreringen är att spegla effekten av ingreppet för varje enskild individ, alltså en jämförelse av enkätsvaren före och efter operation på individnivå.

För att åstadkomma detta har ett rankingpoängsystem konstruerats som innebär att varje svarsalternativ i enkäten åsätts en rankingpoäng.

För att värdera utfallet har ett beslutsträd byggts upp som innebär dels att man bestämt vilka delar av enkäten som skall ingå i nyttovärderingen, dels bestämt vilken turordning som gäller mellan frågeområdena för att avgöra högsta respektive lägsta nytta. För en detaljerad beskrivning av rankingpoäng och beslutsträd hänvisas till två artiklar upptagna i litteraturlistan i slutet av denna rapport (14,15).

I korthet innebär metoden att varje frågeområde bedöms var för sig. De områden som ingår i värderingen är

- daglig aktivitetsnivå
- besvär att utföra dagliga sysslor
- symptom av katarakt
- yrkesarbete
- bilkörning.

Övriga frågeområden tjänar till att dela in patienter i grupper med ungefär likartade förutsättningar (andra sjukdomar och handikapp, ålder, andra ögonsjukdomar t.ex.). Bättre rankingpoäng inom ett frågeområde efter operation än före bedöms som en förbättring oavsett storleken på poängskillnaden.

Utfallet, d.v.s. nyttan, graderas i fem nivåer.

Mycket stor nytta innebär en förbättring av besvär att utföra dagliga sysslor, kataraktsymptom och aktivitet. (När det gäller aktivitet räknas arbete och bilkörning in. Oförändrad aktivitet av en viss storlek bedöms lika positivt som ökad aktivitet.)

Stor nytta innebär en förbättring av besvär att utföra dagliga sysslor och kataraktsymptom.

Viss nytta innebär en förbättring av besvär att utföra dagliga sysslor

Möjlig nytta innebär oförändrade besvär att utföra dagliga sysslor.

Ingen nytta innebär mer besvär att utföra dagliga sysslor än före operation.

Besvär att utföra dagliga sysslor är den viktigaste parametern. Metoden innebär också en beslutsordning vid olika kombinationer av förändringar, gränfall etc.

En bärande tanke bakom metoden är att hänsyn skall tas till individuella preferenser och att en oförändrad god aktivitet värderas lika högt som en förbättring. Detta för att ej poängmässigt favorisera ingrepp i mycket sena stadier av sjukdomen som ju knappast kan betecknas som god sjukvård.

I nedanstående tabell visas utfallet i olika nyttonivåer för 2001 års registrering (2454 patienter).

Tabell 8. Utfallet i fem olika nyttonivåer vid Kataraktregistrets nyttoregistrering 2001.

<u>Nyttonivå</u>	<u>Andel i procent</u>	<u>Akkumulerad andel</u>
Mycket stor nytta	42,2	42,2
Stor nytta	4,7	46,9
Viss nytta	37,2	84,2
Möjlig nytta	8,4	92,5
Ingen nytta	7,5	100,0

Utfall för olika grupper av patienter.


Ser man till vilka preoperativa faktorer som är viktiga för utfallet "Nytta" eller "Icke nytta" finner man att förekomst av annan ögonsjukdom i operationsögat har störst betydelse. Föreligger en annan ögonsjukdom är dessutom åldern en belastning så att i den äldsta åldersgruppen är andelen som får ett utfall klassat som "Nytta" lägst. Föreligger ingen annan ögonsjukdom har åldern ingen signifikant betydelse för huruvida utfallet skall bli "Nytta" eller "Icke nytta".

Ser man till vilka preoperativa faktorer som är viktiga för utfallet "Mycket god nytta" eller ej finner man att operation av det andra ögat är den faktor som har störst betydelse. Opereras det andra ögat är dessutom åldern viktig så att de yngsta åldersklasserna som får andra ögat opererat får utfallet "Mycket god nytta" i högst procent.

Utfall för olika kliniker.

Nyttvariabeln skiljer sig mellan olika kliniker precis som övriga variabler. Orsaken till denna skillnad är förmodligen att söka i klinikernas olika blandning av patienter i olika sjukdomsstadier och med olika grad av riskfaktorer.

I nedanstående stapeldiagram visas spridningen på kliniknivå 2001 när det gäller utfallet i fem olika nyttonivåer. Varje stapel är en klinik och de är rangordnade efter procentsats "Ingen nytta".



Figur 34. Utfall i fem olika nyttonivåer per klinik 2001. Varje stapel motsvarar en klinik. Klinikerna sorterade efter andel "Ingen nytta". Två kliniker med mindre än tio patienter är ej medtagna i diagrammet.

Jämförelse med tidigare år.

Nyttoregistreringen har genomförts under fem år. I nedanstående tabell visas de resultat som uppnåtts för samtliga patienter under vart och ett år.


Tabell 9. Utfallet i fem olika nyttonivåer vid Kataraktregistrets nyttheregistrering 1995-2001.

Nyttonivå	Andel i procent							
	År	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Mycket stor nytta		39,5	36,2	38,0	42,6	39,9	43,9	42,2
Stor nytta		8,3	7,4	6,9	7,9	7,7	3,1	4,7
Viss nytta		35,9	38,2	39,9	34,2	34,8	37,5	37,2
Möjlig nytta		7,2	8,5	6,4	6,8	8,2	5,8	8,4
Ingen nytta		9,1	9,5	8,7	8,4	9,4	9,7	7,5

Under de sju år som nyttheregistreringen pågått har sammanlagt 53 kliniker deltagit i registreringen. Tolv kliniker har bidragit med mer än 450 patienter var till denna registrering. Dessa kliniker är:

S:t Erik, Stockholm	Eskilstuna	Linköping
Jönköping	Växjö	Karlskrona
Lund	Helsingborg	Sahlgrenska/Mölndal
Borås	Europakliniken	NU-sjukvården

I nedanstående stapeldiagram visas dessa klinikers samlade resultat under de sju registreringsåren.



Figur 35. Resultat i fem olika nyttonivåer för de 12 kliniker som deltagit med mer än 450 patienter var i nyttoregistreringen 1995-2001. Varje stapel motsvarar en kliniks samlade resultat under registreringsperioden. Stapel nummer 14 motsvarar det genomsnittliga värdet för alla 13129 patienter i databasen.

Då resultatet av nyttoregistreringen jämförs klinikvis fås ganska stora variationer (fig. 34). En bidragande orsak till detta kan vara slumpvisa variationer på grund av få fall per klinik. I diagrammet ovan (fig. 35) där sju års resultat redovisas är varje kliniks sammanlagda värde baserat på i genomsnitt 582 patienter och ingen klinik bidrar med mindre än 450 patienter. Trots detta förekommer ganska stora variationer mellan klinikerna. Utfallet 'ingen nytta' varierar från 7,9% till 11,5% och andelen som förbättrats varierar mellan 76,4% till 86,9%.

Utvärdering av nyttoregistreringen.

Olika projekt har genomförts rörande nyttoregistreringen och andra projekt pågår. Resultaten av genomförda projekt redovisas i punktform nedan med referenser till publicerade rapporter (nummer inom parentes hänvisar till referenslistan i slutet av denna rapport).

- Äldre patienter (>85 år) utan annan ögonsjukdom har lika god nytta av en kataraktoperation som yngre (21).
- Vanligaste orsaken till dåligt utfall ("ingen nytta") är förekomst av annan ögonsjukdom i operationsögat (19, 21).
- Operation av båda ögon ger signifikant bättre utfall än operation av bara ett öga (19,20,21,27).
- Störst förbättring (andel med "mycket god nytta") uppnås hos yngre personer som fått båda ögon opererade (19).

- En ganska vanlig orsak till mer besvär 6 månader efter operationen än före ("ingen nytta") är störningar från det andra ögat på grund av katarakt där eller på grund av stor sidoskillnad i brytkraft mellan ögonen(anisometri) (20).
- Patienter med samtidig åldersrelaterad makuladegeneration erfar en signifikant bättre synfunktion efter en kataraktoperation och den viktigaste faktorn för en bra självskattad synfunktion är nivån på den postoperativa synskärpan i operationsögat (33).

Endoftalmitregister.

Denna registrering påbörjades i januari 1998. Samtliga kliniker som deltog i basregistret erbjöds anslutning till endoftalmitregistret. Under 2001 har samtliga kliniker ingående i basregistret deltagit.

Vid misstanke om endoftalmit sker registrering varvid följande variabler skall ingå:

Kliniknummer, operationsnummer, datum för klinisk diagnos, sida, huruvida infektionen är odlingsverifierad eller ej.

Tre månader efter den kliniska diagnosen slutrapporteras fallet. Följande variabler ingår i uppföljningen:

Kliniknummer, operationsnummer, huruvida diagnosen står kvar, typ av pre-operativ antibiotikapofylax (i förekommande fall), tvättmetod, per-operativ antibiotikapofylax (i förekommande fall), typ av post-operativ antibiotikapofylax (i förekommande fall), om enukleation vidtagits, slutlig synskärpa på det drabbade ögat.

Resultatet av registreringen framgår av tabell 10.

Tabell 10. Resultat av endoftalmitregistreringen 1998-2001.

År	1998	1999	2000	2001
Antal kataraktoperationer vid deltagande kliniker	54.021	60.163	63.021	70.953
Antal anmälda endoftalmiter	66	30	43	48
Antal med kvarstående diagnos	57=1,06‰	29=0,5‰	40=0,63‰	41=0,58‰
Antal kliniker med något endoftalmit-fall	26	21	22	24
Odlingsresultat: positiv odling	40	25	36	33
negativ odling	11	4	3	8
odling ej tagen	6	1	1	0

Av tabell 10 framgår att antalet endoftalmiter varit färre under 1999 - 2001 jämfört med 1998. Dessutom har hanteringen av endoftalmiter förbättrats avsevärt då odling tagits i nästan samtliga fall.


Som en följd av registreringen 1998 påbörjades en enkät angående rutiner för profylax mot endoftalmiter i slutet av 1999. Detta innebär att de inträffade

endoftalmiterna sedan 1999 kan analyseras i förhållande till typ av given profylax. Denna analys är ännu ej slutförd.

Diskussion.

Ett av registrets ursprungliga syften var att spegla väntetider och tillgänglighet. Medelväntetiden till kataraktoperation minskade under 1992 och 1993 men har sedan början av 1994 gradvis ökat och nådde sitt högsta värde för hela mätperioden under 2000 (Figur 19). Under 2001 ägde en viss förbättring rum. Under hela perioden har det totala antalet kataraktoperationer sakta ökat. Landstingsförbundets fram till 1996 genomförda årliga kömätningar har visat att antalet på väntelista till kataraktoperation var 12 981 vid årsskiftet 1992/93 och ökade därefter till 23 979 vid årsskiftet 1996/97. En kömätning på nationell nivå gjordes runt 1 december 1998 på initiativ av Socialstyrelsens expertgrupp i ögonsjukvård. Härvid visade det sig att 31.500 patienter stod på väntelista till kataraktoperation. Trots en gradvis ökande produktion av kataraktoperationer har man med andra ord inte kunnat hålla jämna steg med efterfrågan vilket lett till ökande köer och allt längre väntetid.

För de enskilda klinikerna har väntetiderna växlat under de tio mätåren. Att klara servicefunktionen med korta väntetider är en kvalitetsfråga för varje klinik. Av nedanstående figur framgår att spridning mellan klinikerna i väntetider varit tämligen stor under hela mätperioden men att den till en början gradvisa försämringen av väntetid under de senaste åren bromsats upp.



Figur 36. Box-plot som visar den årliga spridningen mellan kliniker i hur stor andel patienter man opererat inom 3 månaders väntetid. Andelen anges i procent på y-axeln. Inom varje box ryms 50% av klinikerna för vart och ett år. Den svarta linjen i boxen anger medianvärdet. Linjerna med tvärstreck inrymmer 95% av klinikerna.

Synskärpan före operation har gradvis blivit bättre under de tio åren. Denna förändring var störst i början av mätperioden och har sedan planat ut något. Andel patienter med mycket dålig syn på operationsögat ($\leq 0,1$) har minskat för varje år. Andel patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat har också minskat för varje år bortsett från 1996. Andel patienter med bra syn på andra ögat ($\geq 0,8$) ökade fram till 1994, minskade något därefter men nådde 2001 det högsta värdet hittills. Förändringen av väntetider och synskärpa tyder på att något stabilt tillstånd ej uppnåtts.

Ett annat ursprungligt syfte med registret var att spegla demografiska förhållanden. Kön fördelning och medelålder har i stort sett legat still under tio år. Smärre förskjutningar inom olika åldersklasser har skett. Det föreligger en betydande könsskillnad i operationsfrekvens under samtliga registreringsår. I åldersklasserna 50-89 år är relativa risken för kvinnor att genomgå en kataraktoperation signifikant högre än män. I åldersklassen 70-79 år är denna risk mer än 1,5, det vill säga mer än 50% högre för kvinnor jämfört med män.

Under 1997 inkluderades för första året operationstyp och linsmaterial i basregistreringen. Den årliga utvecklingen uppvisar ganska snabba förändringar i form av ökande andel fako-operationer och ökande andel vikbara linser.

Jämförelsen mellan olika landsting tyder på att nästan samma skillnader föreligger under hela perioden. Detta innebär konkret att stora olikheter föreligger i tillgänglighet och operationsfrekvens. Kvoten mellan högsta och lägsta operations-frekvens på landstingsnivå var 1996 2,9; 1997 2,6; 1998 2,0; 1999 2,5; 2000 3,0 och 2001 1,9. Det innebär således fortfarande stor ojämlikhet i utbud av kataraktoperation beroende på var i landet man bor. Dessutom varierade den genomsnittliga väntetiden till operation på de olika klinikerna mellan 1,1 och 13,7 månader.

Under 2001 genomfördes en *utfallsregistrering* omfattande cirka 9,7% av det totala antalet opererade på deltagande kliniker. Denna registrering visade liksom tidigare på de goda resultat som den sk fako-tekniken för med sig. Andelen operationer med fako-teknik och vikbar lins har ökat för varje registreringsår. En stor del av de skillnader som påvisades mellan olika klinikers tekniska operationsresultat tycks hänföras till i hur stor utsträckning man infört den nya operationstekniken. Uppfattningen från registreringen 1995 står sig, nämligen att de använda mätpunkterna är relevanta och att klinikernas operationskvalitet är god. Den spridning av resultat som trots allt förekommer skall förhoppningsvis stimulera till analyser och fortsatta åtgärder på klinikinivå för att förbättra operationskvaliteten.

Sedan 1998 pågår även en registrering av s.k. *endofthalmiter*, d.v.s. en svår inre ögoninfektion efter kataraktoperationen. Vid dessa årliga registreringar har flera positiva utvecklingslinjer noterats; typen av profylax mot denna infektionstyp har blivit enhetlig i landet, diagnostiken har blivit bättre och komplikationsfrekvensen har minskat.

Som framgått ovan har antalet operationer ökat och därmed också andelen av befolkningen som opereras årligen. Vidare har synskärpan vid tiden för operation blivit bättre.

Det föreligger alltså stora skillnader mellan landsting när det gäller andelen av befolkningen som opereras årligen och vilken funktionsgrad man har vid tiden för operation. Detta leder osökt till frågan om vilka indikationer för kataraktoperation som tillämpas.

För att om möjligt bättre belysa dessa frågor och även vilken *nytta* patienten har av en kataraktoperation påbörjades under 1995 en så kallad nyttoregistrering med hjälp av en patientenkät. Denna registrering har därefter fortsatt årligen. Det dominerande resultatet är att kataraktpatienterna blivit mycket hjälpta av sin operation och att besvärsggraden minskat påtagligt, att nöjdheten ökat och att aktivitetsnivån ökat. Någon avgörande skillnad i patienternas upplevda nytta mellan de sju åren har ej gått att finna. Analys av data har identifierat ett antal omständigheter som är viktiga för utfallet samt även skillnader i utfall mellan olika patientgrupper (sid.35-36).

En fortsatt analys liksom en fortsatt nyttoregistrering kommer att ge ytterligare kunskap både vad gäller indikationer för operation och nyttan med operation. Med långa köer till operation och konkurrens om resurser är detta en nödvändig kunskap.

Referenser

Årsrapporter

1. W. Thorburn, M. Lundström & U. Stenevi. Kataraktoperationer och väntetider under 1992. I Uppföljning och utvärdering av 1992 års nationella vårdgaranti. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1993:11. Socialstyrelsen, Stockholm 1993.
2. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetid under 1993. Rapport baserad på data från Rikskataraktregistret. Kataraktregistret, Ögonkliniken, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona, 1994.
3. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetid under 1994. Rapport baserad på data från Rikskataraktregistret. Medicinsk faktadatabas, MARS: 1995, 2. Socialstyrelsen, Stockholm.
4. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetider under 1995. Rapport baserad på data från Rikskataraktregistret. MARS CD-ROM Ögonsjukvård, febr.1997, Socialstyrelsen, Stockholm.1997.
5. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetider under 1996. Rapport baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 1997.
6. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktkirurgi i Sverige. Årsrapport 1997 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 1998.
7. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktkirurgi i Sverige. Årsrapport 1998 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 1999.

8. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 1999 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2000.

9. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2000 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2001.

Övriga publikationer

10. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. 100.000 operationer i Kataraktregistret. Utfall och nytta följs upp i nästa steg. Läkartidningen, 1995;92:748-750.

11. Stenevi U, Lundström M, Thorburn W. (1995) A National Cataract Register. 1. Description and epidemiology. Acta Ophthalmol Scand 73: 41-44.

12. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. (1996) Assessment of waiting time and priority setting by means of a national register. Int J Technol Ass Health Care 12:1 136-140.

13. Stenevi U, Lundström M, Thorburn W. An outcome study of cataract surgery based on a national register. Acta Ophthalmol Scand. 1997;75:688-691.

14. Lundström M, Roos P, Jensen S, Fregell G. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Description, validity and reliability. J Cataract Refract Surg 1997;23:1226-1236.

15. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W, Roos P. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Assessment of surgical outcomes. J Cataract Refract Surg 1998;24:968-974.

16. Nytt- och utfallsregistrering i det Nationella Kataraktregistret. MARS-Nyheter Nr 7 November 1997. Socialstyrelsen, Stockholm 1997.

17. "Sveriges vanligaste kirurgi" i Tema: Kirurgi. Svensk Medicin nr 59. Svenska Läkarsällskapet och Spri. Spri förlag. Stockholm 1998.

18. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Gender and cataract surgery in Sweden 1992-1997. A retrospective observational study based on the Swedish National Cataract Register. Acta Ophthalmol.Scand. 1999;77:204-208.

19. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Outcome of cataract surgery considering the pre-operative situation. – A study of possible predictors of the functional outcome. Brit J Ophthalmol. 1999;83:1272-1276.

20. Lundström M, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. Impaired visual function following cataract surgery assessed using the Catquest questionnaire. J Cataract Refractive Surg. 2000;26:101-108.

21. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery in the very elderly. *J Cataract Refractive Surg.* 2000;26:408-414.
22. Lundström M, Brege KG, Florén I, Roos P, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and effectiveness. 1. Variation in costs between different providers of cataract surgery. *Acta Ophthalmologica Scand.* 2000;78:335-339.
23. Lundström M, Roos P, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and effectiveness 2. An index approach for the measurement of output and efficiency of cataract surgery at different surgery departments. *Acta Ophthalmologica Scand.* 2001;79:147-153.
24. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Age-related utilisation of cataract surgery in Sweden during 1992-1999. A retrospective study of cataract surgery rate in one-year age groups based on the Swedish National Cataract Register. *Acta Ophthalmologica Scand.* 2001;79:342-349.
25. Olofsson P, Lundström M, Stenevi U, Gender and referral to cataract surgery in Sweden. *Acta Ophthalmologica Scand.* 2001;79:350-353.
26. Håkansson I, Lundström M, Ehinger B, Stenevi U. Data reliability and structure in the Swedish National Cataract Register. *Acta Ophthalmologica Scand.* 2001;79:518-522.
27. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Quality of life after first- and second-eye cataract surgery. Five-year data collected by the Swedish National Cataract Register. *J Cataract & Refract Surg.* 2001;27:1553-1559.
28. Lundström M, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. Strategy to reduce the number of patients perceiving impaired visual function after cataract surgery. *J Cataract & Refract Surg.* 2002;28:971-976.
29. Montan P, Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Endophthalmitis following cataract surgery in Sweden. The 1998 national prospective survey. *Acta Ophthalmol Scand.* 2002;80:258-261.
30. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. The Swedish National Cataract Register: A 9-year review. *Acta Ophthalmol Scand.* 2002;80:248-257.
31. Kobelt G, Lundström M, Stenevi U. Cost-effectiveness of cataract surgery: Method to assess cost-effectiveness using registry data. *J Cataract & Refract Surg* 2002; 28:1742-1749
32. Althin R, Lundström M, Roos P. A new index approach to measure lost benefits from progression to blindness. *Inter J Technol Assess Health Care* 2002;18:635-644.
33. Lundström M, Brege KG, Florén I, Lundh B, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and quality of life in patients with age-related macular degeneration (AMD). *Brit J Ophthalmol* In press.

Protokoll för det Nationella Kataraktregistret.

- Protokollet reviderat senast 2002-08-31.

Bakgrund och syfte

Det nationella kataraktregistret inrättades ursprungligen för att följa effekten av införandet av vårdgarantin för patienter väntande på operation för grå starr. Basregistret fokuserar på demografi, väntetider till operation och synfunktion vid tiden för operation. Registret har utvidgats att omfatta utfallsdata, upplevd nytta med ingreppet och förekomst av postoperativ endoftalmit (infektion i ögats inre). Ett viktigt syfte är att dokumentera olikheter i landet beträffande tillgänglighet och utfall.

Registrets syfte och långsiktiga mål är

- att vara ett totalregister, det vill säga att alla opererande enheter rapporterar all sin verksamhet avseende kataraktkirurgi, vilket möjliggör redovisning av kataraktkirurgin per åldersklass, kön, synskärpegrupper, besvärnivåer mm per region/sjukvårdsdistrikt
- att utgöra nationell bas för enskilda klinikers kvalitetssäkring av den samlade kataraktkirurgiska verksamheten genom att resultatet av kirurgin redovisas kontinuerligt per opererande enhet på ett enhetligt sätt. Enhetens verksamhet kan genom tillgången på referensmaterial sakligt redovisas gentemot konsumenter, beställare och uppköpare av kirurgi. Genom att enhetlig redovisning används ges också möjlighet att jämföra enhetens resultat över tid.
- att stimulera kvalitetsförbättring genom att enhetligt underlag för jämförelse är tillgängligt och genom påvisande av goda exempel
- att genom sin storlek möjliggöra analys av ovanliga utfall
- att dokumentera rutinsjukvårdens utfall
- att genom utvärdering av patientens upplevda nytta av operationen förbättra kunskapen om rätta indikationer och optimal tidpunkt för operation, och på så vis få underlag för en fortlöpande diskussion om indikationer och motiv varför resurser skall allokeras till denna verksamhet
- att utgöra en bas för beräkningar av operationsbehov och utforma prognoser för utvecklingen
- att värna den unika möjlighet som ett totalregister ger att fördjupa och utveckla kunskapen om kataraktsjukdomen, bl.a. dess epidemiologi, indikationer för åtgärd och konsekvenser för individ och samhälle.

Kommentar.

Kunskapsläget i dag när det gäller ovanstående mål är sådant att det inte finns vetenskapliga rapporter som beskriver utfallet i rutinsjukvård för svenska förhållanden. Ett fåtal rapporter finns som beskriver utfallet i amerikanska multi-center studier. Dessa rapporter innehåller dock variabler och metoder att mäta synfunktion ur patientens perspektiv som inte är helt relevanta för svenska förhållanden.

Randomiserade kontrollerade kliniska studier kan svårligen klara av att belysa rutinsjukvårdens utfall, analys av mycket ovanliga utfall eller fungera som jämförelse mellan olika kliniker. Enskilda klinikers register möjliggör inte en säker jämförelse genom olikheter i definitioner och mätmetoder och har otillräckligt underlag för att belysa ovanliga utfall. Vid all form av elektiv kirurgi är målsättningen att operera rätt patient på rätt indikation vid rätt tidpunkt och med rätt teknik. Gråstarrskirurgi är till sin karaktär en utpräglad elektiv verksamhet. Ingen annan ansats kan ge underlag för att uppnå målsättningen så bra som det nationella kataraktregistret.

Registerhållare

Docent Mats Lundström, Ögonkliniken, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona.

Huvudman

Sveriges Ögonläkarförening.

Övriga medlemmar i registrets styrgrupp

Docent Ulf Stenevi, Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, 431 80 Mölndal.

Docent William Thorburn, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå.

Registersekreterare

Irene Serring, Ögonkliniken, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona.

Tel. 0455/ 735159, Fax 0455/ 20133.

Deltagande enheter (2001)

S:t Eriks Ögonsjukhus

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Nyköpings lasarett

Universitetssjukhuset i Linköping

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Centrallasarettet, Växjö

Västerviks sjukhus

Länssjukhuset, Kalmar

Visby lasarett

Blekingesjukhuset, Karlskrona

Kristianstads Centralsjukhus

Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Universitetssjukhuset, Lund

Lasarettet, Helsingborg

Lasarettet, Landskrona

Länssjukhuset, Halmstad
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
NU-sjukvården (Uddevalla sjukhus + Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan)
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Kärnsjukhuset, Skövde
Centralsjukhuset, Karlstad
Regionsjukhuset, Örebro
Läkargruppen, Örebro
Falun lasarett,
Hudiksvalls sjukhus
Länssjukhuset Gävle - Sandviken
Länssjukhuset Sundsvall – Härnösand, Sundsvall
Länssjukhuset Sundsvall – Härnösand, Härnösand
Örnsköldsviks sjukhus
Östersunds sjukhus
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Skellefteå lasarett
Gällivare sjukhus
Sunderbyns sjukhus, Sunderbyn
Höglandssjukhuset, Eksjö
Sjukhuset i Varberg
Strandvägskliniken, Stockholm
Lasarettet i Ystad
Piteå älvåldals sjukhus
Europakliniken, Stockholm
Sofiahemmet, Stockholm
Sjukhuset i Ängelholm
Ögonkliniken Medocular, Uppsala
Kungsbacka sjukhus
Lycksele lasarett
Ögonkliniken Medocular, Göteborg
Rubes Ögonklinik, Trollhättan
Medocular, Linköping
Medocular, Norrköping
Vårda Ögonklinik, Göteborg

Ögonkliniken Varberg
Medocular Malmö
Transmedica Trelleborg
Sollefteå Ögonklinik
Medocular, Örnsköldsvik
Globen, Stockholm
Novius, Stockholm
Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg

Sponsorer

Under 2001 har verksamheten finansierats av Socialstyrelsen.

Deltagande enheter har bidragit med resurser i form av arbetstid. En engångsavgift har även tagits ut från kliniken inför övergång till Internet baserad registrering.

Landstinget Blekinge har bidragit med lokal och försäkringskostnad.

Aktuellt

År 2001:

Kataraktoperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige i dag. Under 2001 utfördes 73.513 kataraktoperationer. Medelåldern var 76,1 år och 66,1% var kvinnor. Av 54.499 kataraktoperationer utförda i offentlig regi var 94,9% inrapporterade till registret och av 19.014 utförda i privat regi var 95,6% inrapporterade till registret. Samtliga offentliga kliniker utom Västerås samt 17 privata enheter deltar. Ingen bias av betydelse har identifierats.

Fullständigheten i rapporteringen kontrolleras genom jämförelse med två andra registreringar i Ögonläkarförningens och Landstingsförbundets regi.

Datainspektionen

Den ursprungliga ambitionsnivån innebar enbart registrering av preoperativa data. Dessa innehåller inget personnummer eller annan möjlig identifiering i det ögonblick data matats in i registret. Denna form av registrering prövades hos datainspektionen varvid man konstaterade att ett personregister ej förelåg.

Sedan 1994 pågår utfallsregistrering. För detta ändamål krävs att personidentifikation är möjlig under uppföljningstiden som är 6 månader. Denna registrering har godkänts av Datainspektionen.

Datainspektionens krav om samtycke tillgodoses genom ett informationsblad till patienter.

Etisk granskning

Registrets verksamhet när det gäller bedömning av patientnyttan med hjälp av patientenkät har underställts och godkänts av etisk kommitté.

Registrets planerade duration

Planerad duration är tills vidare (se bakgrund och syfte).

Samkörning med andra register

Samkörning med andra register är ej planerad.

Kriterier för inklusion/exklusion

Preoperativ registrering: Samtliga patienter som genomgår en kataraktoperation deltar. Operationen måste fullföljas för att registrering skall ske. Ambitionen med registret är att samtliga kliniker i landet (offentliga såväl som privata) rapporterar sina genomförda kataraktoperationer.

Registret omfattar såväl planerade som akuta ingrepp. Även i de fall kataraktoperationen kombineras med annat ingrepp (t. ex. trabekulektomi, hornhinnetransplantation) registreras patienten liksom i de fall då kataraktoperationen ej görs i synförbättrande syfte (t.ex. för bättre insyn till ögonbotten då andra behandlingskrävande sjukdomar föreligger).

Sekundär linsimplantation efter tidigare kataraktoperation utan intraokulär lins ingår ej i registret.

Utfallsregistrering: Utfallsregistreringen görs på en begränsad del av operationerna under ett kalenderår. För närvarande används som inklusionskriterium samtliga konsekutiva operationer som utförs under en kalendermånad. Eventuellt bortfall på grund av ofullständiga uppgifter eller andra skäl omhändertas vid sammanställning av resultatet på registernivå, ej av inrapporterande klinik. Mars månad har hittills använts som registreringsmånad. Under denna månad utförs i genomsnitt 10% av årets operationer på de flesta kliniker.

Nyttoregistrering: Samtliga kliniker erbjuds delta med alla operationer som utförs under en månad. Avsikten är att denna registrering skall göras samtidigt med utfallsregistreringen och på samma patienter.

Endoftalmitregistrering. Startade 1/1 1998. Registrerar postoperativ infektion i ögats inre (=endoftalmit). Samtliga kliniker anslutna till registret deltog under 2001.

Variabler som registreras

Basregister: Demografiska data, väntetid, synförmåga vid operationstillfället, om tidigare starroperation utförts, huruvida annan ögonsjukdom föreligger i operationsögat, operationstyp och typ av intraokulärlins . Dessutom noteras om båda ögon opereras samma dag.

Utfallsregister: Skillnad mellan planerad och slutlig refraktion, inducerad astigmatism, skillnad i brykraft mellan det opererade och icke opererade ögat, erhållen synskärpa, uppföljningstid, huruvida operationen har läkt 6 månader efter ingreppet, huruvida patienten kan medverka och eventuell mortalitet under uppföljningstiden.

Nyttoregister: Patientenkät före och identisk enkät 6 månader efter operation med uppgifter om

- upplevda synbesvär
- aktivitetsnivå
- kataraktsymptom
- hjälpbehov m.m.

Endoftalmitregister. Anmälan på särskild blankett vid misstanke om inträffad endoftalmit. Uppföljningsblankett 3 månader efter insjuknandet. Variabler som registreras är bland annat om odling tagits, framodlad mikrob, typ av pre- per- och postoperativ profylax samt tvättmetod, om diagnosen kvarstår 3 månader efter anmälan samt slutlig synskärpa.

Instruktioner till uppgiftslämnare

Skriftlig manual för ifyllande av utfallsblanketter finnes. I övrigt cirkulärbrev.

Registrering och interna rapporter

Registrering görs efter genomförd kataraktoperation. Varje patient och operation registreras på ett eget formulär, samlingslistor förekommer ej. Respektive operationsklinik kan välja att sända in data på sina registrerade patienter på ettdera av följande sätt: Ifyllda formulär per post, diskett per post eller direktinmatning till databasen via modem.

Deltagande kliniker har rekommenderats att insända data till registret minst var annan vecka. Registret administreras av ett kansli med en sekreterare. Uteblir registrering under en månad kontaktas respektive klinik.

Utdata från registret sammanställs på ett särskilt standardformulär. En sådan sammanställning görs efter varje kvartal och tillställs samtliga deltagande kliniker.

Varje klinik får i standardrapporten statistik gällande den egna klinikens data för det senaste kvartalet samt ackumulerat under året. Dessutom får man hela registrets samlade data ackumulerat under året. En årsrapport med analys tillställs också samtliga deltagare.

Kontrollfunktioner

Registrets datafunktion medger inte registrering av orimliga värden.

Databasen accepterar i princip inte ofullständiga formulär. Någon enstaka uppgift av vissa i förväg definierade uppgifter i formuläret kan dock saknas.

Vid enstaka tillfällen har kontroll av eventuell dubbelinmatning gjorts liksom enstaka kontroller av avvikelser i inmatning då medvetet ett antal dubbla registreringar gjorts.

Samtliga opererande kliniker rapporterar antalet kataraktoperationer på årsbasis till Sveriges Ögonläkarförening. Jämförelser görs mellan dessa uppgifter och antalet rapporterade operationer i registret.

Planerade rapporter

Vetenskapliga rapporter från registret har ej varit planerade från början.

Registrets utvidgning med flera års data är dock av stigande vetenskapligt intresse.

Ögonläkarföreningens arbetsgrupp som driver registret (styrgruppen) har inhämtat tillstånd från deltagande kliniker att utnyttja data för eventuella vetenskapliga rapporter. Samma villkor gäller som för de nationella rapporterna, d.v.s. ingen enskild kliniks data skall kunna identifieras i rapporten.

Inget hindrar att enskilda deltagande kliniker utnyttjar registret för egna vetenskapliga sammanställningar. I detta sammanhang gäller samma regler som för de nationella rapporterna, d.v.s. ingen klinik får tillgång till andra enskilda klinikers data. Man har

således enbart tillgång till den egna klinikers data samt registrets samlade utdata gällande hela den nationella registreringen för den aktuella perioden.

Periodiska rapporteringar

Kvartalrapport.

Nationell redovisning

Årsrapporter görs innehållande en genomgång av hela registrets data för året samt jämförelser med föregående års statistik. Regionala skillnader samt skillnader på klinikinivå påpekas. En viss analys av data görs.

Årsrapporten tillställs alla deltagande kliniker samt anslagsgivande myndighet.

Det förutsättes att deltagande kliniker vidarebefordrar årsrapporten liksom tillämpliga delar av kvartalrapporten till sin huvudman.