

Patient personnummer: _____

Efternamn: _____ Förnamn: _____

Ålder vid registrering: 5år 10år 16år 19år 1 år postop ortognat

Undersökningsdatum: _____ ej kommit följs ej vidare

Modifierat Huddart Bodenham index (vid 5år, 10år, 19år, 1år postop ortognat) ej möjligt

Anterior poäng 1+1	Höger sida / posterior poäng 3 + 4 + 5 + (6)	Vänster sida / posterior poäng 3 + 4 + 5 + (6)
Σ=	Σ=	Σ=

Bedömning av incisiver

Bedömning av hörntänder

Bedömning av premolarer/molarer

Beräkning av MHB

Saknad central incisiv – samma poäng som andra centrala incisiven

Saknad hörntand – poängsätt efter kristatoppen

Saknad primär molar / premolar – poäng som intilliggande premolar (saknas tänder siktas efter kristans mitt)

Vid alla åldrar: båda centrala incisiver
= summa poäng för 2 tandpar

Vid 5 år: hörntand + 2 primära molarer
= summa poäng för 3 tandpar

Vid 10, 19 år & 1 år postop: hörntand + 2 premolarer + 1 molar
= summa poäng för 4 tandpar

Vid 10 år:
Agenesi permanenta tänder (gäller ej 8or). Ange tand/tänder: _____ ej möjligt

Vid 5år, 10 år, 19 år samt 1 år postop ortognat: kliniska fotografier, studiemodeller, profilröntgen.

Kefalometri:

SNA: _____ SNB: _____ NAPg: _____ NSL/NL: _____ NSL/ML: _____ ej möjligt

OBS: när patienten genomgått ortognat kirurgi före 19 års ålder ersätts 19-års-data av preop-data.